

TABELLA ORIENTATIVA PER LA SEMINA

Ortaggio	Semi per grammo	Profondità di semina cm	Temperatura ottimale °C	Temperatura minima °C	Media giorni di emergenza	Ciclo colturale giorni	Durata germinativa del seme anni
ANGURIA	8-12	2-3	25	15	10-12	80-120	4
ASPARAGO	40-50	1,5-2	15-20	10	25-30	3 anni	3-4
BASILICO	800	0,5	25	10	12-15	40-50	3-4
BIETOLA da coste	50	1,5	15-20	5	10-12	50-60	5
BIETOLA da orto	50-60	1,5-2	15-20	7-8	10-12	50-80	5
CARDO	25	1-2	18-20	5	15-20	160-200	5-6
CAROTA	800-850	0,2-0,5	18	6	15-30	70-120	3-4
CAVOLO	300-350	0,5	18-20	6	8-10	100-180*	4-5
CECE	2-5	3	20	12	10-12	80-100**	5-6
CETRIOLO	30-40	1,5-2	25	15	6-10	60-90	5
CICORIA	500-600	0,5	15-20	5	6-8	120-150***	4
CIMA DI RAPA	300-400	0,5	15-20	5	6-8	40-150	5
FAGIOLINO	3-5	2-3	25	15	8-10	50-70	2-3
FAGIOLO	3-5	2-3	25	15	8-10	70-90	2-3
FAVA	3-8	3-5	18	5	10-12	120-180	3-4
FINOCCHIO	150-200	1	20	6-8	14-18	100-150	3
INDIVIA	600-700	0,5	18-20	5-6	8-10	90-100	4
LATTUGA	700-900	0,5	15-20	5	6-8	50-100****	4
MELANZANA	200-250	0,5-1	22-24	15	15-20	150-180	4-5
MELONE	30-35	1,5-2	25	15	10-12	80-120	5
PEPERONE	150	0,5-1	20-25	15	15-20	150-180	3
PISELLO	3-5	2-3	15	5	10-12	80-100*****	3
POMODORO	300-400	0,5	20-22	12-13	10-12	130-180	4-5
PORRO	350-400	0,5-1	15-20	5	15-25	120-180	2
PREZZEMOLO	400-500	0,5	15-20	5	25-30	80-90	3
RAFANO	100-120	0,5-1	15-20	5	6-8	60-120	5

RAPA	300-500	0,5-1	15-20	5	6-8	40-90	5
RAVANELLO	120-150	0,5-1	15-20	5	6-8	25-50	5
RUCOLA	500	0,5	15-20	5	6-8	30-40	4
SCORZONERA	90-100	1-2	15-20	7-8	12-15	120-150	2
SEDANO	2500	0,5	15-20	7-8	20-25	100-150	3
SEDANO RAPA	2500	0,5	15-20	6-7	20-25	120-150	3
SPINACIO	90-100	1,5-2	15	5	12-15	40-65	3
VALERIANA	12-14	0,5-1	20-25	7-8	25-30	60-70	3-4
ZUCCA	2-14	2-3	25-30	10	10-12	130-150	4
ZUCCHINO	4-8	2-3	25-30	15	10-12	45-70	5

Temperatura minima: temperatura al di sotto della quale la pianta sopravvive ma smette di crescere.

Ciclo colturale: tempo necessario per ottenere il prodotto; dipende dalla varietà.

* il dato si riferisce al cavolfiore, cavolo cappuccio, broccolo e verza. Per il cavolo cinese è di 50-100 giorni, per il cavolo rapa di 80-150.

** il dato si riferisce a varietà a semina primaverile; per varietà a semina autunnale è di 80-100 giorni.

*** il dato si riferisce alla cicoria da cespo; per la cicoria catalogna è di 120-180 giorni.

**** : il dato si riferisce alla lattuga cappuccio e a quella romana.

***** il dato si riferisce a semine primaverile; per quelle autunnali è di 180-200.